





الموضوع الأول

محاوَر الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة															
		مجزأة	المجموع														
3	<p>التمرين الأول : (03 نقاط)</p> <p>1- أ/ : - النظائر ذرات عنصر لها نفس العدد الذري Z وتختلف في العدد الكتلي A.</p> <p>- النواة المشعة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أخرى (ابن) وجسيمات α أو β أو إشعاع γ.</p> <p>- ب/ ${}^A_Z\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$</p> <p>بتطبيق قانوني الإنحفاظ : ${}^{210}_{84}\text{Po}$</p> <p>2- أ/ ملء الجدول :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>t(jours)</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>50</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>$-\ln \frac{N(t)}{N_0}$</td> <td>0</td> <td>0,10</td> <td>0,25</td> <td>0,40</td> <td>0,50</td> <td>0,60</td> </tr> </table> <p>ب/ رسم البيان : خط مستقيم يمر بالمبدأ</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ج/ قانون التناقص :</p> $N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}$ $\ln \frac{N(t)}{N_0} = -\lambda t \Rightarrow -\ln \frac{N(t)}{N_0} = \lambda t \Leftrightarrow y = At$	t(jours)	0	20	50	80	100	120	$-\ln \frac{N(t)}{N_0}$	0	0,10	0,25	0,40	0,50	0,60	0.25x2	0.25x2
	t(jours)	0	20	50	80	100	120										
	$-\ln \frac{N(t)}{N_0}$	0	0,10	0,25	0,40	0,50	0,60										
	0.25																
	0.5																
0.25																	
0.25																	

العلامة		عناصر الإجابة	محاوَر الموضوع
المجموع	مجزأة		
	0.25	<p>البيان المحصل عليه خط مستقيم يمر بالمبدأ عبارته من الشكل $y=At$ وهي تتفق مع عبارة التناقص الإشعاعي.</p> <p>د / تعيين قيمة λ</p> <p>ميل المستقيم</p> $A = \frac{\Delta \left(-\ln \frac{N}{N_0} \right)}{\Delta t} = 5 \times 10^{-3} \text{ jours}^{-1} = 5,78 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$	
	0.25	<p>هـ /</p> $N = N_0 e^{-\lambda t} \quad t = t_{1/2} \Rightarrow \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$	
	0.25	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 138,9 \text{ jours}$	
	0.25	<p>التمرين الثاني : (03 نقاط)</p> <p>1 - مخطط الدارة الكهربائية</p> 	
	0.25	<p>الشكل 1-</p> $u_{AB} = L \frac{di}{dt} + ri = E \quad u_{AB} = E \quad / \text{أ} - 2$ <p>ب / تبيان أن : بالتعويض بالعبارتين :</p>	
	0.25x2	$\frac{di}{dt} = I_0 \cdot \frac{r}{L} (e^{-r/Lt}) \quad i(t) = I_0 (1 - e^{-r/Lt})$ <p>في المعادلة التفاضلية نجد : $E - E = 0$</p> <p>- المعادلة التفاضلية : تقبل العبارة المعطاة كحل لها</p>	
	0.5	<p>3 - في النظام الدائم : $\frac{di}{dt} = 0$ / أ</p> $I_0 = \frac{E}{r} \Rightarrow I_0 = 0,45 \text{ A} \quad ; \quad \frac{di}{dt} = 0$	
	0.25	<p>ب / $r = 10 \Omega$ ، $L = 1 \text{ H}$ / ج ،</p> $\tau = \frac{L}{r} = 0,1 \text{ S}$	
	0.25	<p>4 - / أ</p> $E = \frac{1}{2} L I_0^2 = 0,101 \text{ joules}$	
	0.25	<p>ب /</p> $u_{AB} = L \frac{di}{dt} + ri = 4,5 e^{-10t}$	
	0.25	$u_{AB} \text{ at } t=0,3 = 4,5 e^{-3} = 0,224 \text{ V}$	

العلامة		عناصر الإجابة				معايير الموضوع
المجموع	مجزأة					
		التمرين الثالث : (03 نقاط)				
	0.25	$n=CV=\frac{m}{M} \Rightarrow m = CVM = 60mg$ /1				
	0.25	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+$ /2				
		/3 جدول التقدم				
	0.25	المعادلة	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+$			
		ح. الجملية	التقدم	كميات المادة بالمول		
		ح. ابتدائية	0	10 ⁻³	زيادة	0 0
		ح. انتقالية	x	10 ⁻³ - x	//	x x
		ح. نهائية	X _f	10 ⁻³ - X _f	//	X _f X _f
			X _{max}	0	//	X _{max} X _{max}
		التقدم الأعظمي X _{max} هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما يخف المتفاعل المحد.				
		$CV - x_{max} = 0 \quad x_{max} = CV = 10^{-3} mol$				/4 - 4
	0.25	$G = K\sigma \Rightarrow \sigma = \frac{G}{K}$				
	0.25	$\sigma = [H_3O^+] \cdot \lambda_{(H_3O^+)} + [CH_3COO^-] \cdot \lambda_{(CH_3COO^-)}$ ب/ ج/ التوازن :				
		$[CH_3COO^-] = [H_3O^+] = \frac{x}{V}$				
		$\frac{G}{K} = [H_3O^+] (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})$				
	0.25x2	$[H_3O^+] = \frac{G}{K (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})} = 4,1 \times 10^{-4} mol / l$				
	0.25	$pH = -\lg [H_3O^+] = 3,4$ / د				
	0,25	$Q_{r\ddagger} = \frac{[H_3O^+]^2}{[CH_3COOH]} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$ /5				
	0.25	يمثل كسر التفاعل عند التوازن ثابت الحموضة Ka (ثابت التوازن k)				
	0,25	$K = Ka = Q_{r\ddagger} = \frac{(4,1 \times 10^{-4})^2}{95,9 \times 10^{-4}} = 1,67 \times 10^{-5}$				
	0.25	$Ka = 10^{-pKa} \quad pKa = 4,8$: pKa الثنائية /6				

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
		<p>التمرين الرابع: (03 نقاط)</p> $F = \frac{G \times m \times M_T}{r^2} \quad /1$ <p>/2 وحدة ثابت الجذب العام:</p> $G = \frac{F \cdot r^2}{m \cdot M_T}$ $G = \frac{[\text{Kg}] [\text{L}] [\text{S}^{-2}] [\text{L}^2]}{[\text{Kg}] \cdot [\text{Kg}]}, \quad G : \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$ <p>/3 عبارة السرعة الخطية:</p> $F = \frac{G \cdot m M_T}{r^2}, \quad F = m a_n$ $a_n = \frac{v^2}{r}, \quad \frac{v^2}{r} = \frac{G \cdot M_T}{r^2}, \quad v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{r}}$ <p>/4 عبارة (v) بدلالة الدور: $v = \frac{2\pi r}{T}$</p> <p>/5 عبارة (T) $v = \frac{2\pi r}{T}, \quad v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{r}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M_T}}$</p> <p>/6 النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$:</p> $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_T} = k \quad /1$ <p>النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ لا تتعلق بأي قمر، بل تتعلق بكتلة الجسم المركزي فقط.</p> $k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_T}, \quad k = 9,9 \times 10^{-14} \quad (\text{SI})$ <p>ب/ الدور T:</p> <p>لدينا $\frac{T^2}{r^3} = k$ ومنه $T = \sqrt{kr^3}$ أي $T = 12\text{h}$</p>	
0.25	0.25		
0.25	0.25		
0.25	0.25		
0.5	0.5		
0.25	0.25		
0.25	0.25		
0.25	0.25		
0.25	0.25		
0.25x2	0.25x2		

العلامة		عناصر الإجابة	تطور الموضوع
المجموع	مجزأة		
		<p>التمرين الخامس : (04 نقاط)</p> <p>1 / عبارة السرعة : بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة :</p> $E_{pA} - E_{cA} = E_{pB} + E_{cB} = C^{te}$ <p>0.25</p> <p>0.5 نجد:</p> $V_B = \sqrt{2gL\sin\alpha} \quad , \quad V_B = 7,07m/s$ <p>2 / خصائص شعاع السرعة عند C:</p> <p>0.25 - الحامل: مماس لقوس الدائرة في النقطة C.</p> <p>- الجهة: جهة الحركة.</p> <p>- الطويلة: 7,07m/s لأن C تقع في نفس المستوى الأفقي مع B.</p> <p>0.25 3 - $\sum \vec{F} = \vec{0}$ على $y'y'$ $R_1 = mg\cos\alpha \Rightarrow R_1 = 1,73N$ /</p> <p>0.5 \vec{ON} على $R_2 = mg + ma_n = mg + \frac{mv^2}{r} \Rightarrow R_2 = 7,44N$ ب/</p>	
	0.25x2	 	
	0.25	4 / معادلة المسار في (Cxy) :	
	0.25	$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$	
	0.25	$\vec{V} \begin{cases} V_x = V_c \cos\alpha \\ V_y = V_c \sin\alpha - gt \end{cases}$	
	0.25	$\vec{OM} \begin{cases} X = V_c \cos\alpha \times t \\ Y = V_c \sin\alpha \times t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$	
	0.5	$y = \frac{-0,5g}{V_c^2 \cos^2 \alpha} x^2 + xt g \alpha$	
	0.5	15 / النقطة (M) ترتيبها $y_M=0$:	
		$x_M = \frac{2V_c^2}{g} \cos\alpha \times \sin\alpha \Rightarrow x_M = 4,33m$	

0.25

التمرين التجريبي : (04 نقاط)

1- جدول التقدم :

المعادلة		$Mg_{(s)} + 2H_3O^+ = 2H_2O_{(l)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}_{(aq)}$				
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة بالمول				
ح. ابتدائية	0	0,041	0,30		0	0
ح. انتقالية	x	0,041-x	0,30-2x	//	x	x
ح. نهائية	x_f	0,041- x_f	0,30-2 x_f	//	x_f	x_f

0.25

$$n(H_2) = x = \frac{V_{H_2}}{V_M}$$


2- ملء الجدول :

0,5

t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_{H_2}(mL)$	0	336	625	810	910	970	985	985	985
x ($10^{-2} mol$)	0	1,4	2,6	3,4	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1

3- رسم المنحنى : $x = f(t)$

0.5



0.5

4- التقدم النهائي : من البيان $x_f = 0,041 mol$

0.25

$$Mg \text{ ومنه المتفاعل المحد هو } \begin{cases} n_{Mg} = \frac{m}{M} = \frac{1,0}{24,3} = 0,041 mol \\ x_f = n_{Mg} \end{cases}$$

0,25

5- سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين : هي سرعة التفاعل لأن : $v = \frac{dx}{dt} = \frac{dn}{dt}$

0.25

$$\text{ميل المماس : } P_{t=0} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \approx 2,0 \times 10^{-2} mol/min$$

0.25

$$P_{t=3min} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0,6 \times 10^{-2} mol/min$$

ميل المماس :

العلامة		عناصر الإجابة	مخاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
	0.25	<p>$V_3 < V_0$ لأن تراكيز المتفاعلات تتناقص مع الزمن.</p> <p>6- زمن نصف التفاعل: $t_{1/2}$</p> <p>هو المدة التي يبلغ فيها تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي</p>	
	0.25	<p>من $x_f = x_{\max}$.</p> $x = \frac{x_f}{2} = \frac{x_{\max}}{2} \approx 0,02 \text{ mol}$ <p>نقرأ من البيان $t_{1/2} = 1,5 \text{ min}$</p> <p>-7</p>	
	0.25	$\eta_{(H_3O^+)} = CV - 2x_f = 0,218 \text{ mol}$	
	0.25	$[H_3O^+] = \frac{\eta_{(H_3O^+)}}{V} = 3,63 \text{ mol/L}$	

الموضوع الثاني

العلامة		عناصر إجابة	محاوير الموضوع																													
المجموع	مجزأة																															
	0.25	<p>التمرين الأول: (03 نقاط)</p> <p>1-I / المعادلة المندمجة لتفاعل حمض البنزويك والماء :</p> $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}$ <p>2- / جدول تقدم التفاعل :</p>																														
	0.25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المعادلة</th> <th colspan="4">$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}$</th> </tr> <tr> <th>الحالة</th> <th>التقدم</th> <th>$n(C_6H_5COOH)$</th> <th>$n(H_2O)$</th> <th>$n(C_6H_5COO^{-})$</th> <th>$n(H_3O^{+})$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ح. ابتدائية</td> <td>0</td> <td>$n_0 = CV$</td> <td>زيادة</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ح. انتقالية</td> <td>x</td> <td>$n_0 - x$</td> <td>//</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>ح. نهائية</td> <td>x_f</td> <td>$n_0 - x_f$</td> <td>//</td> <td>x_f</td> <td>x_f</td> </tr> </tbody> </table>	المعادلة	$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}$				الحالة	التقدم	$n(C_6H_5COOH)$	$n(H_2O)$	$n(C_6H_5COO^{-})$	$n(H_3O^{+})$	ح. ابتدائية	0	$n_0 = CV$	زيادة	0	0	ح. انتقالية	x	$n_0 - x$	//	x	x	ح. نهائية	x_f	$n_0 - x_f$	//	x_f	x_f	
المعادلة	$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}$																															
الحالة	التقدم	$n(C_6H_5COOH)$	$n(H_2O)$	$n(C_6H_5COO^{-})$	$n(H_3O^{+})$																											
ح. ابتدائية	0	$n_0 = CV$	زيادة	0	0																											
ح. انتقالية	x	$n_0 - x$	//	x	x																											
ح. نهائية	x_f	$n_0 - x_f$	//	x_f	x_f																											
	0.25	<p>3- / حساب التراكيز المولية لأنواع الكيمائية :</p> $\sigma = \lambda_{H_3O^{+}} \cdot [H_3O^{+}]_f + \lambda_{C_6H_5COO^{-}} \cdot [C_6H_5COO^{-}]_f :$																														
3	0.25	<p>لدينا من جدول التقدم $[H_3O^{+}]_f = [C_6H_5COO^{-}]_f = \frac{x_f}{V}$</p>																														
	0.25	$[H_3O^{+}]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^{+}} + \lambda_{C_6H_5COO^{-}}} = \frac{0,86 \cdot 10^{-2}}{(35 + 3,24) \cdot 10^{-3}} = 2,2 \times 10^{-4} \text{ mol } L^{-1}$ <p>ومنه :</p> $[C_6H_5COO^{-}]_f = 2,2 \times 10^{-4} \text{ mol } L^{-1}$																														
	2 x 0.25	$[C_6H_5COOH]_f = \frac{n_0 - x_f}{V} = C_1 - [C_6H_5COO^{-}]_f = 9,78 \cdot 10^{-3} \text{ mol } L^{-1}$																														
	0.25	<p>4- / نسبة التقدم $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^{+}]_f}{C_1} = 0,022 = 2,2\%$</p>																														
	0.25	<p>بما أن $\tau_f < 1$ التحول غير تام ومنه نستنتج أن حمض البنزويك حمض ضعيف.</p>																														


العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
		<p>5- حساب ثابت التوازن :</p> $K_1 = \frac{[H_3O^+]_f [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$ $K_1 = \frac{(0,22 \cdot 10^{-3})^2}{9,78 \cdot 10^{-3}} = 4,95 \cdot 10^{-3}$ <p>II-أ/ نسبة التقدم τ_{2f} : $\tau_{2f} = \frac{[H_3O^+]_f}{C_2} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-3}} = 0,063 = 6,3\%$</p> <p>ب/ المقارنة بين τ_{2f} ، τ_{1f} ، بما أن $C_1 = C_2$ و $\tau_{2f} > \tau_{1f}$ نستنتج أن حمض الساليسليك أقوى من حمض البنزويك.</p>	
		<p>التمرين الثاني : (03 نقاط)</p> <p>1- عبارة القوة $F_{S/J}$:</p> $F_{S/J} = G \frac{Ms \cdot mj}{r^2}$ <p>2- أ/ انمرج الهليو مركزي: مرجع مركزه الشمس ومحاوره الثلاثة موجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة.</p> <p>ب/ عبارة a : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد: $\Sigma \vec{F} = m_j \times \vec{a}_G$</p> <p>بحيث $F_{S/J} = ma_G \Rightarrow a_G = a_n = G \frac{Ms}{r^2}$</p> <p>ج/ عبارة السرعة: $a_n = \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot Ms}{r}} = 1,3 \times 10^4 m/s$</p> <p>3- عبارة الدور: $T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = 3,77 \times 10^8 S$</p> <p>4- القانون الثالث لكيبلر: مربع دورا الكوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط بين مركز الكوكب ومركز الشمس.</p> <p>من $v = \frac{2\pi \cdot r}{T}$ ، $v = \sqrt{\frac{G \cdot Ms}{r}}$ نستنتج: $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot Ms}$</p>	<p>0.25X2</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25X2</p> <p>0.25X2</p> <p>0.25</p> <p>0.25X2</p>
		<p>التمرين الثالث : (03 نقاط)</p> <p>1 / معادلة التفكك النووي : ${}^{18}_9F \rightarrow {}^{18}_8O + {}^4_2X$</p> <p>حسب مبدأ إنحفاظ العددين A و Z نجد :</p> <p>${}^{18}_9F \rightarrow {}^{18}_8O + {}^4_2He$ ، Z=1 ، A=0 زمنه :</p> <p>- الإشعاع الصادر : β^+</p> <p>2 / $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>

العلامة		عناصر الإجابة	مخارج الموضوع
المجموع	مجزأة		
3	0.25	لدينا قانون التناقص الإشعاعي : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ ومنه	
	0.25	$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ ومنه $\ln \frac{1}{2} = \ln e^{-\lambda t_{1/2}} \quad \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$	
	0.25	- حساب λ : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \Rightarrow \lambda = \frac{0,693}{110 \times 60} = 1,05 \cdot 10^{-4} s^{-1}$	
	0.25x2	3-أ/ عدد أنوية الفلور لحظة التحضير: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}; A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$	
	0.25	ومنه : $N_0 = \frac{A(t)}{\lambda e^{-\lambda t}} = \frac{2,6 \cdot 10^8}{1,05 \cdot 10^{-4} e^{-1,05 \cdot 10^{-4} \cdot 3600}} \Rightarrow N_0 = 3,6 \cdot 10^{12} \text{ noyaux}$	
	0.25	ب/ الزمن المستغرق ليصبح النشاط 1 % من النشاط عند الساعة التاسعة) : $A(t) = \frac{A_0}{100} = A_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \frac{1}{100} = e^{-\lambda t}$	
	0.25x2	ومنه : $-\ln 100 = -\lambda t \rightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln 100 = 4,4 \times 10^4 s$ أي : $t = 12h, 12 \text{ min.}$	
		التمرين الرابع : (03 نقاط) 1-أ/ شحن المكثفة . ب/ بواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة أو جهاز إعلام آلي مزود ببطاقة مدخل. ج/ المعادلة : بتطبيق قانون جمع التوترات: $u_{AB} + Ri - E = 0 \Rightarrow u_{AB} + Ri = E$ مع $i = \frac{dq_A}{dt} = C \frac{du_{AB}}{dt}$ يأتي $u_{AB} + RC \frac{du_{AB}}{dt} = E$ د/ عبارة ثابت الزمن للدائرة : $\tau = RC$ التحليل البعدي : $U = RI \Rightarrow [R] = [U][I]^{-1}$ $i = C \frac{dU}{dt} \Rightarrow [C] = [I][T][U]^{-1}$ ومنه : $[\tau] = [R][C] = [V][A]^{-1} \times [A][T][V]^{-1} = [T]$ τ له بعد الزمن فهو يقدر بـ s. هـ/ العلاقة التي تحقق المعادلة التفاضلية السابقة هي : $u_{AB} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ بالتعويض في المعادلة التفاضلية $u_{AB} + RC \frac{du_{AB}}{dt} = E$ بالعلاقة: $u_{AB} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ ومشتقتها بالنسبة للزمن فنجد أن الطرفين متساويين: أي أن المعادلة التفاضلية تقبل العبارة المعطاة كحل لها.	

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع																														
المجموع	مجزأة																																
3	0.5	<p>و/ شكل المنحنى:</p>																															
	0.25	<p>ي/ المقارنة من البيان:</p>																															
	0.25	<p>عند $t = 5\tau$ ، $u_{AB} = 11,9 V$</p> <p>$0,99 = \frac{11,9}{12} = \frac{u_{AB}}{E}$ المكثفة في اللحظة $t = 5\tau$ بلغت 99 % من شحنتها</p> <p>أ- يحدث تفريغ للمكثفة.</p> <p>ب/ الطاقة المحولة:</p> <p>$E = \frac{1}{2} C u_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-6} \times 12^2 \rightarrow E = 7,2 \times 10^{-5} J$</p>																															
0.25x2		<p>التمرين الخامس : (04 نقاط)</p> <p>II-1 / الثنائيتين : $(I_{2(aq)}^- / I_{(aq)}^-)$ ، $(S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-})$</p> <p>1 / جدول التقدم:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المعادلة</th> <th colspan="5">$S_2O_8^{2-} \div 2I_{(aq)}^- = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}$</th> </tr> <tr> <th>ح الجملة</th> <th>التقدم</th> <th>$n(S_2O_8^{2-})$</th> <th>$n(I^-)$</th> <th>$n(I_2)$</th> <th>$n(SO_4^{2-})$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ح. ابتدائية</td> <td>0</td> <td>$n_{01} = C_1 V_1$</td> <td>$n_{02} = C_2 V_2$</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ح. انتقالية</td> <td>x</td> <td>$n_{01} - x$</td> <td>$n_{02} - 2x$</td> <td>x</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>ح. نهائية</td> <td>x_f</td> <td>$n_{01} - x_f$</td> <td>$n_{02} - 2x_f$</td> <td>x_f</td> <td>$2x_f$</td> </tr> </tbody> </table> <p>3- / تحديد المتفاعل المحد:</p> <p>$n_{01} - x_f = 0 \Rightarrow x_f = C_1 V_1 = 2,0 \times 10^{-1} \times 50 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} mol$</p> <p>$n_{02} - 2x_f = 0 \Rightarrow x_f = \frac{C_2 V_2}{2} = \frac{1,0 \times 50 \times 10^{-3}}{2} = 2,5 \times 10^{-2} mol$</p> <p>ومنه : $x_f = 10^{-2} mol$ والمتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$</p> <p>4/ زمن نصف التفاعل : هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي</p> <p>أي من أجل $x = \frac{x_f}{2}$ استنتاج قيمة $t_{1/2}$ بيانيا .</p>	المعادلة	$S_2O_8^{2-} \div 2I_{(aq)}^- = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}$					ح الجملة	التقدم	$n(S_2O_8^{2-})$	$n(I^-)$	$n(I_2)$	$n(SO_4^{2-})$	ح. ابتدائية	0	$n_{01} = C_1 V_1$	$n_{02} = C_2 V_2$	0	0	ح. انتقالية	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - 2x$	x	2x	ح. نهائية	x_f	$n_{01} - x_f$	$n_{02} - 2x_f$	x_f	$2x_f$	
المعادلة	$S_2O_8^{2-} \div 2I_{(aq)}^- = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}$																																
ح الجملة	التقدم	$n(S_2O_8^{2-})$	$n(I^-)$	$n(I_2)$	$n(SO_4^{2-})$																												
ح. ابتدائية	0	$n_{01} = C_1 V_1$	$n_{02} = C_2 V_2$	0	0																												
ح. انتقالية	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - 2x$	x	2x																												
ح. نهائية	x_f	$n_{01} - x_f$	$n_{02} - 2x_f$	x_f	$2x_f$																												

العلامة		عناصر الإجابة							
المجموع	مجزأة								
	0.25x2	$n(S_2O_8^{2-}) = \frac{n_{01}}{2} = 5.10^{-3} \text{ mol} = \frac{x_f}{2} = \frac{x_{\max}}{2}$ <p>$t_{1/2}$ يوافق ومنه نجد : $t_{1/2} = 17,5 \text{ min}$</p>							
4		<p>5- / تراكيز الأنواع الكيميائية في اللحظة $t_{1/2}$</p> <p>0.25 $[S_2O_8^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{C_1 V_1 - x}{V_1 + V_2} = \frac{5 \times 10^{-3}}{0,1} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol / L}$</p> <p>0.25 $[I_2]_{t_{1/2}} = \frac{x}{V_1 + V_2} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol / L}$</p> <p>0.25 $[I^-]_{t_{1/2}} = \frac{C_2 V_2 - 2x}{V_1 + V_2} = \frac{50 \times 10^{-3} - 2 \times 5 \times 10^{-3}}{0,1} = 4,0 \times 10^{-1} \text{ mol . L}^{-1}$</p> <p>0.25 $[SO_4^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{2x}{V_1 + V_2} = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol . L}^{-1}$</p> <p>0.25 $[K^+]_{t_{1/2}} = \frac{2C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2} = 7,0 \times 10^{-1} \text{ mol . L}^{-1}$</p> <p>6/ تعيين السرعة الحجمية في اللحظة $t = 10 \text{ min}$</p> <p>0.25 $v_{\text{mol}} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} \cdot x = n_{01} - n_{(S_2O_8^{2-})}$ لدينا</p> <p>$\frac{dx}{dt} = - \frac{dn_{(S_2O_8^{2-})}}{dt}$ سرعة التفاعل = سرعة الاختفاء</p> <p>0.25 من البيان نجد : $\frac{dn}{dt} = - \frac{5 \times 10^{-3}}{7,5 \times 2,5} = -2,7 \times 10^{-4} \text{ mol / min}$ ميل الماس</p> <p>0.25 ومنه : $v_{\text{mol}} = \frac{1}{0,1} \times 2,7 \times 10^{-4} = 2,7 \times 10^{-3} \text{ mol . L}^{-1} \text{ min}^{-1}$</p>							
		<p>التمرين التجريبي : (04 نقاط)</p> <p>0.25 1- / طبيعة حركة السيارة خلال المدة τ_1 : حسب مبدأ العطالة $\sum \vec{F} = \vec{0}$ فالحركة مستقيمة منتظمة</p> <p>ب/ حساب النسبة $\frac{d_1}{v}$:</p> <table border="1"> <tr> <td>0.25</td> <td>$\frac{d_1}{v} (s)$</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> </table> <p>0.25 من الجدول نستنتج : $\frac{d_1}{v} = C^{te}$ ومنه d_1 يتناسب طرديا مع v</p> <p>0.25 ج- / قيمة τ_1 : من الجدول نجد $\tau_1 = 1s$</p>	0.25	$\frac{d_1}{v} (s)$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0.25	$\frac{d_1}{v} (s)$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

1-2/ نمذجة الافعال المؤثرة على السيارة خلال عملية الكبح



0.25x2

0.25

ب/ إيجاد العلاقة الحرفية بين v^2 و d_2
بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة : $E_0 - |W_{(\bar{F})}| = E$ على الجملة (السيارة)
عند التوقف : $E=0$ ومنه $E_0 = |W_{(\bar{F})}|$ حيث $W_{\bar{F}} = -F d_2$

0.25x2

$$\frac{1}{2} M v^2 = F_{f/G} d_2 \rightarrow v^2 = \frac{2F_{f/G}}{M} d_2$$

ج/ رسم البيان $v^2 = f(d_2)$:

$v^2 (m/s)$	192,9	493,8	625,0	771,6	933,6
$d_2 (m)$	14	35	45	55	67

0.25

0.25

د/ البيان عبارة عن مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل : $v^2 = k d_2$
حساب معامل التوجيه k .

0.25

$$k = \frac{\Delta v^2}{\Delta d_2} \approx 14 m/s^2$$

0,25

بالمطابقة بين العلاقة النظرية والبيانية نجد:

$$F_{f/G} = k \frac{M}{2} \text{ ومنه } k d_2 = \frac{2F_{f/G}}{M} d_2$$

0.25

$$F_{f/G} = \frac{14 \times 9.10^2}{2} = 63.10^2 N$$

المنحنى البياني : $v^2 = f(d_2)$

0.25x2

